Les allergènes cachés dans les aliments

Martine Drouet
Unité Allergologie Générale
CHU ANGERS

Conflits d'intérêt

- Intérêts financiers : néant
- Liens durables ou permanents :
 - Industrie agro-alimentaire: Lactalis /Brioche Pasquier/ Charal / Cyranie (Protocole Manoe: Maitrise Allergène NutritiOn Enfant)
 - AFPRAL
- Interventions ponctuelles : dans le cadre du protocole MANOE
- Intérêts indirects : néant

Involvement of hidden allergens in food allergic reactions

Anibarro et coll – J Investig Allergol Clin Immunol 2007

Les allergènes cachés dans les aliments

- **Autres aliments**
 - Soumis à déclaration obligatoire
 - Non soumis à déclaration obligatoire
 - Aliments sans étiquetage
 - Non identifiés par le consommateur
 - terminologie
 - langue étrangère
 - Utilisés comme colorants
 - Introduits de façon frauduleuse
- **Néo allergènes induits par les procédés de fabrication**
- **Contaminants**
 - Acariens / moisissures / parasites
 - médicaments
 - Aluminium

Aliments soumis
à déclaration obligatoire

Règles de l'étiquetage obligatoire

- 2000
 - ADO (Allergènes à Déclaration Obligatoire) = Directive 2000/13/CE
- 2003-2005
 - 14 ingrédients à déclaration obligatoire

Directive 2003/89/CE appliqué en 2005	
1. Céréales contenant du gluten	7. Lait (origine non précisé)
2. Crustacés	8. Fruits à coque
3. Œuf	9. Céleri
4. Poissons	10. Moutarde
5. Arachide	11. Sésame
6. Soja	12. Anhydrides sulfureux et sulfites (si > 10 mg/kg ou 10 mg/l)
Directive 2007/68/CE: ajout de 2 allergènes	
13. Lupin	14. Mollusques

Nouveautés

2011 règlement 1169/2011/CE

Lisibilité	Emballage > 80 cm² → Taille minimale = 1,2 mm Emballage < 80 cm² → Taille minimale = 0,9 mm
Déclaration des allergènes	Mise en relief Répétition des allergènes présents est obligatoire
Etiquetage de l'origine	Etiquetage obligatoire de l'origine des ingrédients primaires (ingrédients représentant plus de 50%) si l'origine est différente de celle étiqueté sur le produit
Déclaration des huiles végétales	Chaque huile doit être citée

2011 règlement 1169/2011/CE

Annexe II

- Les ingrédients et auxiliaires technologiques possédant des allergènes → nature précise de l'allergène entre parenthèse

E 160c	E 160c (Paprika)
E 162	E 162 (Rouge de Betterave)
E 74	E 74 (Gélatine de ...)
E 1105	E 1105 (Lysosyme)

Aliments soumis à déclaration obligatoire

- En théorie:
 - peu de problème
- En pratique
 - Ambiguïtés → pièges pour le consommateur

Quentin (1993)

- Atopique (Dermatite atopique - rhinite – asthme)
- 1997 (4 ans) : Allergie au lait de chèvre
 - Fromage chèvre → urticaire généralisée + vomissement

IgE totales: 5869 KUI/L		
Allergènes	PT	IgE s
Lait chèvre	10/35 pseudopodes	776
Lait vache	8/25 pseudopodes	7,69

Evolution des IgE s Lait chèvre depuis 1999

Accidents cliniques

2000	Yaourt nature → toux Fouasses au pâté → toux +++ (présence de fouasses au fromage de chèvre)
2001	1 bol de lait de vache → asthme Croque Monsieur → asthme
2002	Yaourt au BA → asthme + érythème visage + prurit paume des mains
2004	Yaourt → asthme Saint Nectaire → asthme
2005	Crêpe jambon fromage « Marie » (fromage fondu 3%) → asthme +érythème visage <i>Nous interrogeons la Société Marie: « pas de fromage de chèvre mais leur fournisseur a une double chaine de fabrication fromage de LV et fromage de LC → contamination? »</i>
2006	Croque Monsieur → asthme
2007	Panini → asthme + érythème et œdème du visage
2010	Cordon Bleu « Maitre Coq » → asthme + érythème et œdème du visage
2011	Cordon Bleu « Maitre Coq » sans fromage → syndrome oral
2013	Cordon Bleu « Maitre Coq » vidé de son fromage → urticaire généralisée + asthme

Ingrédients

- Viande de dindonneau reconstituées traitées par salaison: 57% (viande de dinde, de poulet, eau, peau de poulet, farine de blé, protéines de soja, conservateurs: E250, E316, sirop de glucose, arômes)
 - Panure: 27% [chapelure (farine de blé, levure, sels, épices) farine, sel]
 - Jambon de dinde cuit standard au goût fumé 11% (viande, sirop de glucose, protéines de soja, conservateurs: E250, E316, stabilisants E 451, E 452; épaississants: carraghénanes, arômes)
 - **Fromage fondu: 11%** (fromage, amidon, protéines de lait, sel de fonte : E331, E 339, tara, sel, arôme) Huile de palme
- Peut contenir des traces d'œuf, céleri, moutarde

Nous interrogeons la société « Maître Coq »:

« ce fromage est élaboré à partir de différents fromages dont les fromages à base de lait de vache et de brebis »

Lucile Y (2006)

- Atopique
- Poly allergie alimentaire (Lait vache – œuf – moutarde - Noix cajou/pistache)
- 2010:
 - Accoutumance alimentaire lait vache → RAS
- 2011
 - Accoutumance alimentaire œuf → variable (incidents parfois: rhinite / vomissements)
- Régime suivi scrupuleusement pour moutarde- Noix cajou/pistache)
 - Consomme régulièrement du chocolat « Praliné double noisette » de la marque Côte d'Or

Lucile Y (2006)

- Décembre 2013
 - 1 carré de chocolat « Praliné double noisette » Côte d'Or
→ œdème endo buccal , dysphagie, dyspnée, urticaire généralisée, malaise
 - Polaramine[®] + Celestène[®] → 0
 - Adrénaline : non fait
 - Appel du 15
 - Transfert au CHU
 - Garder en surveillance qq heures
 - Retour au domicile
 - Récidive de l'urticaire

Composition

Chocolat au lait fourré (39%)
au praliné noisettes, amandes,
et **noix de cajou** avec éclats
de noisettes (7%)

Traditionnellement

Le praliné se compose

- de pralin : fourrage de sucre, d'amandes et/ou de noisettes
- d'un peu de vanille, de cacao ou de beurre de cacao enrobé de chocolat au lait.

Chocolat au lait du Pays Alpin

« Milka »

- **Chocolat au Lait du Pays Alpin**
Ingrédients:
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, pâte de cacao, lactosérum en poudre, beurre concentré, pâte de noisettes, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanilline).
Cacao: 30% minimum.
- **Peut contenir des traces d'autres fruits secs à coque et de blé.**

Autres aliments « piège »

- Frangipane – certains nougats
 - Amande remplacée par arachide
- Charcuterie
 - Présence d'œuf , de pistache ou autre fruits à coque
- Certaines panures
 - Présence de graines (sésame – pavot...)
- Certaines sauces (Pesto):
 - Pignon de pin remplacé par noix de cajou

Aliments non soumis
à déclaration obligatoire

Aliments violemment réactogènes non soumis à déclaration

- Sarrazin → anaphylaxie sévère
 - Autrefois: peu problématique car aliment non caché
 - Actuellement: aliment caché
 - Pains spéciaux
 - Certaines pâtes
- Lait brebis / lait chèvre
 - Spécificité d'espèce non obligatoire sur l'étiquetage

Aliments sans étiquetage

Dangers en boulangerie – pâtisserie

- Mélange de farines (fève, lupinetc)
- Contaminants des farines (acariens , moisissures...)
- Œuf plus ou moins cuits (exemple de la crème pâtissière)

Dangers au restaurant

- Crêperie
 - Sarrazin contaminant le froment
- Pizzeria
 - Lait chèvre / brebis
 - Noix cajou dans sauces
- Restaurants exotiques
 - Poisson / Crevette / Arachide
- Restaurants divers

Aliments non identifiés
Terminologie – langue étrangère

Les synonymes

- Blé = froment
- Lysozyme = allergène de l'œuf
- Sarrazin = blé noir
- Noix du Brésil = noix d'Amazonie
-

Langues étrangères

- Accident fatal récemment déclaré au RAV
- Du à la noix de cajou
- Présente dans une barre biscuitées d'origine anglaise
- Noix de cajou = cashew nut

Aliments utilisés comme
colorants

Aliments utilisés comme colorants

- Remplacement des additifs chimiques par des colorants naturels
- Colorants issus de fruits, légumes et plantes comestibles
- Absence de traitement chimique
- Exemples :
 - Sorbet Framboise « Carte d'Or »:
 - couleur rouge = jus de betterave
 - « Gervais paille Danone » goût fraise et pêche-abricot:
 - couleur = jus concentré de carottes pourpre
 - Dessert pomme-fraise « Andros »:
 - couleur rouge = jus de cassis
- Problème
 - Procédés de fabrication inconnu → présence de protéines?

Mme TH..... Jacqueline

31/01/1948

- Patiente sensibilisé au latex
- Allergie alimentaire
 - Avocat
 - Poivron/paprika

- Histoire complémentaire d'allergie alimentaire
 - Crevette – courgette – raisin → choc anaphylactique

Conclusion

- Colorant présent dans les crevettes
.....
- E 160 c = extrait de paprika

Aliments introduits
de façon frauduleuse

Aliments introduits frauduleusement

- Lait de vache dans le lait de chèvre
- Lait de chèvre dans le lait de vache??
- Viande de cheval en remplacement de viande bœuf

Néo-allergènes

Isolat de blé

- Gluten non soluble → déamidé → gluten soluble = liant
- Utilisé
 - dans l'industrie agro alimentaire (viandes reconstituées, pâtes , sauce ...)
 - Dans l'industrie cosmétique
- Cliniquement
 - Allergie souvent isolée sans allergie au blé natif
 - Mais parfois associé à l'allergie au blé

Aliments susceptibles de contenir l'Isolat de blé

- Produits de boulangerie
- Viandes reconstituées
- Sauces industrielles
- Soupes industrielles
- Certaines pâtes
- Certaines confiseries
-

Néo allergène lait de vache dans les fromages de LV

Constat clinique

- Les patients allergiques au lait chèvre/brebis décrivent parfois des manifestations allergiques mineures (SOA) avec les fromages de lait de vache

- **Beaumesnil M.** Thèse - Faculté de médecine Angers – octobre 2009

- **Beaumesnil M, Denery-Papin S, Drouet M, Gaudin JC.**

Allergy to goat/sheep's milk with good tolerance to cow's milk but not to Cow's milk cheese.

Identification of 1-105 peptide from k-casein as the molecular basis of reactivity toward cow's milk cheese for two patients.

- *Research in immunology: An International Journal 2013*

Patients allergiques au lait de chèvre

	Histoire clinique		IgE spécifiques			
	LC	LV	LC <i>f 300</i>	LV <i>f 2</i>	Fromages fermentés LV/LB <i>f 82</i>	Fromages pâte cuite LV <i>f 81</i>
1	+	+	> 100	1,7	Nf	Nf
2	+	+	> 100	2,25	0,68	3,29
3	+	-	> 100	5,5	0	0
4	+	-	2,45	0	0,12	0
5	+	+	2,84	0	Nf	Nf
6	+	+	17,2	0,87	0,7	0,2
7	+	?	> 100	1,37	0,7	3,5
8	+	+	> 100	3,2	1,36	3,9
9	+	+	> 100	3,1	1,29	7,2

Patients allergiques au lait de chèvre

inhibition des IgE spécifiques chez 2 patients (2 et 8)

Patient n° 8

Inhibition des IgE s fromages « pâte cuite » (LV) par **LV** et **LC**

Patient n°2

Inhibition des IgE s fromages « pâte cuite » (LV) par **LV** et **LC**

- Le lait de vache inhibe la fixation des IgE s aux fromages de LV: logique
- Le lait de chèvre inhibe la fixation des IgE s aux fromages de LV
Cela signifie: un allergène du lait de chèvre est présent dans le fromage de lait de vache

Patients allergiques au lait de chèvre

Immuno -blot chez 2 patients (2 et 8)

- Peptide 1-105 présent dans les 2 fromages de lait de vache testés (Camembert et Leerdamer)
- Ce peptide n'est pas présent dans le lait de vache
- Néo allergène obtenu par clivage de la caséine κ par la chymosine, protéase utilisée dans la fabrication des fromages

Patient allergique au lait chèvre/ brebis

**rapportant des événements cliniques
avec les fromages de lait de vache**

2 hypothèses

- Contamination du LV par du LC
- Néo allergène du LV après transformation en fromage

Contaminants

ACARIENS

Aliments contaminés par des acariens

- 1963: *Herranz G Rev Med Univ Navarra 1963*
 - Anaphylaxie fatale chez un homme de 56 ans, après consommation d'un mélange lait + blé contaminé par acariens
- 1993: *Erben AM. JACI 1993*
 - Anaphylaxie après ingestion de beignets contaminés par *Dermatophagoides Farinae*

Aliments contaminés par des acariens

Anaphylaxie après ingestion de farine
bilan d'allergie alimentaire négatif
n = 16 patients

16/16
PT
et
IgE s
acariens

14/16
(87%)

Histoire
clinique
d'intolérance
aux AINS

4 Farines récupérées

3 farines à
pâtisserie
provenant de la
même usine

1 farine à pizza
(farine blé + levure
de boulangerie)

Examen microscopique

*Derm .
Farinae*
1 cas

*Thyreophagus
entomophagus*
3 cas

Etude microscopique de 4 farines incriminées / farines témoins

Patiente	Farines	Poids échantillon en mg	Nombre d'acariens	Nombre d'acariens par g	Espèces d'acariens		
					D Pter	D far	Th. Ento.
1	incriminées	150	735	4900	-	100	-
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	378	20	53	75	25	-
2	incriminées	110	5,742	52,2	-	-	100
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	450	15	33	40	60	-
3	incriminées	170	1,559	9,1	0	1	99
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	250	0	0	-	-	-
4	incriminées	109	4,1	37,6	-	-	100
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	825	0	0	-	-	-

Quantification des allergènes des 4 farines incriminées / farines

témoin

patients	Farines	Concentration d'allergène µg/g		
		Der p 1	Der f 1	Der p 2
1	incriminées	< 0,05	14,6	35,9
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	< 0,05	< 0,05	0,55
2	incriminées	< 0,05	< 0,05	22,7
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	< 0,05	< 0,05	0,6
3	incriminées	< 0,05	< 0,05	0,8
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	< 0,05	< 0,05	0,6
4	incriminées	< 0,05	< 0,05	0,7
	Témoin (même provenance – sachet fermé)	< 0,05	< 0,05	0,65

Hypothèses pour la responsabilité de Der p 2

- Der p 2
 - allergène résistant à la chaleur
- Der p 1
 - Allergène moins présent dans les céréales du fait de l'interaction Der p 1 / prolamine (gliadine)

Aliments contaminés par des acariens

Aliments contaminés par des acariens

- 2007: *Sanchez-Borges M JACI 2007*
 - **Anaphylaxie induit par l'exercice** (AIE) après consommation de pancakes contaminés par acariens (*Suidasia medanensis*)
 - Jeune fille de 16 ans
 - Ingestion de pancakes → 30 mn → football → 15 mn → réaction anaphylactique
 - Atcd atopique: rhino-conjonctivite – asthme – allergie au calamar
 - Bilan allergie alimentaire < 0
 - Tests cutanés positifs pour acariens (*D Pter et Blomia*) et farines contaminées
 - Analyse des pancakes : *Suidasia medanensis*

Syndrome d'anaphylaxie aux acariens par ingestion

- Oral mite anaphylaxis (OMA) ou « pancake syndrome »
- Plus fréquent en zone tropicale (température et humidité favorable à la prolifération des acariens)
- Mais de plus en plus décrit dans d'autres zones
- Allergènes thermostables
 - allergène du groupe 2

Nombre de cas du syndrome d'anaphylaxie orale aux acariens

Espagne	59
japon	32
Venezuela	31
Etats unis	7
Panama	1
Singapour	1
Taiwan	1

Syndrome d'anaphylaxie aux acariens par ingestion

Critères diagnostiques

- Symptômes compatibles survenant après ingestion d'aliment à base de farine de blé
- Antécédent atopique (rhinite, asthme, dermatite atopique...)
- Réactivité IgE aux acariens (PT et IgE s)
- Réactivité cutanée aux farines incriminées
- Absence de réactivité aux farines identiques non contaminées
- Identification microscopique des acariens dans les farines incriminées
- Identification des allergènes des acariens
- Hypersensibilité aux AINS

MOISSISSURES
LEVURES

Aliments contaminés par des moisissures

- Penicillium

- Présent intentionnellement (Saucisson -Fromages à moisissure bleue)
- Contaminant
- Anaphylaxie induite par l'exercice *Fiocchi et al. JACI 1997*

- Autres moisissures? Peu décrit

- Levure (*Saccharomyces cerevisiae*)

- Patient allergique aux moisissures environnementales ayant présenté une réaction anaphylactique après ingestion d'aliment avec levure

Airola et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2006

ANISAKIS

Cycle de *Anisakis simplex*

Jean François Pays

Parasito -Necker

ANOFEL

Diagnostic de l'allergie à Anisakis

- Réactions anaphylactiques après ingestion de poissons peu ou non cuits, de céphalopodes
- IgE spécifique positives

Diagnostic différentiel

- Allergie au poisson
- Intoxication alimentaire
 - Ciguatera : intoxication par ingestion de chairs de poissons tropicaux contaminées par une algue *Gambierdiscus Toxicus* présente sur les récifs coraliens

ANTIBIOTIQUES

Réglementation et contrôle

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA
FORÊT

Limite maximale en résidus LMR

Fixée par la réglementation européenne, pour les espèces animales destinées à la **consommation humaine** (viande, lait, œufs, etc.),

Temps d'attente

Temps d'élimination de la quasi totalité des traitements avant que les produits ou denrées qui en sont issus ne soient consommés
Défini en fonction du médicament.

Les résidus d'antibiotiques

- **sans danger** pour le consommateur
- quelle que soit la durée de traitement,
- si le temps d'attente a été respecté.
- Le respect de ce temps permet de garantir que la quantité de résidus se situe en dessous de la limite maximale en résidus de médicaments.

Contrôles

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA
FORÊT

Effectués par les services de la **Direction générale de l'alimentation** pour détecter les **non-conformités** (présence de résidus médicamenteux > LMR)
Concentration détectée non-conforme → **mesures engagées**

interdiction de mise sur le marché,
retrait des produits, etc.

Plus de **20 000 prélèvements** sont réalisés chaque année dans les denrées d'origine animale.

En 2012

Pour les animaux de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcins, équins),

- 9 354 prélèvements → 28 cas non conformes.

Dans la filière volailles,

- 2 045 prélèvements → Aucune non-conformité

Exemple de l'amoxicilline

	LMR Limite Maximale en résidus	1 kg
Viandes	50 ppb	0,00005 µg
Lait	4 ppb	0,000004 µg

$$1\text{ppb} = 10^{-6}\mu\text{g}/\text{kg}$$

Littérature allergologique

- *Lindermayr H, et coll - Allergy 1981*
Challenge of penicillin –allergic volunteers with penicillin contamination meat.
- *Tinkelman Dg et al:Ann allergy 1984*
Anaphylaxis presumed to be caused by beef containing streptomycin.
- *Kanny G, et coll. Allergie et Immunologie 1994.*
Alimentary anaphylactic shock: implication of penicilin résidues
- Après 1994: aucun article

ALUMINIUM

60 millions de consommateurs – Mars 2014 – N°491

LAITS POUR NOURRISSONS

Trop d'alu dans les laits infantiles

Premier âge, deuxième âge... quelle préparation choisir parmi les 200 références vendues en supermarché ou en pharmacie ? Que contiennent-elles, et surtout sont-elles dénuées de polluants, en particulier d'aluminium ? Nous l'avons recherché dans une cinquantaine de laits infantiles et de croissance

Impact de la présence d'aluminium

- Neurotoxicité: +++
- Allergie: non évoquée par la revue «60 millions de consommateurs »
- Dose tolérable définie par l'EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments)
 - 1 mg /kg de poids corporel / semaine
 - soit 7 mg/ semaine pour un nourrisson de 7 kg
 - Soit 1 mg /j

Étude « 60 Millions de consommateurs »

Consommation moyenne d'aluminium via les laits infantiles

	Consommation de lait infantiles	Consommation moyenne d'aluminium par semaine
Nourrisson < 6 mois	4 biberons de 210 ml Soit 840 ml/jour	897 μg /semaine <i>Environ 12,5 % de la dose hebdomadaire tolérable (7200 μg)</i>
Nourrisson > 6 mois	3 biberons de 210 ml Soit 630 ml /jour	874 μg /semaine <i>Environ 12,5 % de la dose hebdomadaire tolérable (7000 μg)</i>

A priori rien d'inquiétant sauf que.....

- La dose moyenne tolérable
 - Est établi pour une population générale (enfant / adulte)
 - Pas de norme spécifique à l'enfant
 - Pour des problèmes de neurotoxicité
 - Et non pour une éventuelle sensibilisation allergique
- Relation avec l'allergie à l'aluminium des vaccins ??

L'avenir des aliments cachés

De nombreux autres allergènes se profilent

- Pois jaune = version séchée du petit pois (*Pisum Sativum*)
- Utilisé en alimentation humaine
- Appellation
 - Isolats de protéines de pois, farine de pois, fibres ou amidons de pois
- Utilisé
 - Emulsifiants des sauces, plats cuisinés, produits laitiers et glace, viandes, poissons, aliments diététiques, panification, pâtisserie, snacks

De nombreux autres allergènes se profilent

- 26 enfants allergiques à au moins une légumineuse et sensibilisés au pois jaune
- TPO pois jaune
 - 8 enfants (30,8%) réactifs
 - 18 patients (69,2%) non réactifs

Grade 1: 1 patient
Grade 2: 6 patients
Grade 4: 1 patient

De nombreux autres allergènes se profilent

- Insectes = source de protéines

Tenebrio molitor
Ver de farine

- Allergie aux insectes ingérés
 - *Publications essentiellement asiatiques*
 - *Ji KM et al. Allergy 2008*
- Sensibilisation croisée entre acarien – crevette et Tenebrio molitor
 - *Kitty CM et al - Food and Chemical Toxicology 2014*

MERCI

POUR VOTRE ATTENTION